



Boletín Epidemiológico Semanal

Dirección Regional Salud Tumbes

Dr. Luis Constantino Arévalo Guerrero
Director General



41

Del 05 de
octubre al 11
de octubre 2014

Presentación

La Dirección Ejecutiva de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 41, el cual contiene información actualizada del comportamiento de los principales daños sujetos a vigilancia epidemiológica, que han sido notificados en la presente semana por los establecimientos de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Región.

Dirección Ejecutiva de
Epidemiología

Dr. Rommell Veintimilla
González Seminario
Médico - Director

Dr. Fernando Antonio
Quintana Ynfante
Médico Epidemiólogo

Dr. Cesar Augusto
Noblecilla Rivas
Médico Epidemiólogo

Tec. Carlos Eladio
Olivares Barrientos
Coordinador Regional de
Vigilancia Epidemiológica

Bach. Ronald Edward
Hernández Vargas
Responsable de Notificación

Bach. Milagros del Carmen
Lojas Rodríguez
Equipo Técnico

PTCI. Gerson Adhemir
Rodríguez Vilela
Equipo Técnico

Teléfono: 072 522427
Telefax: 072 523789

email: epitumbes@dge.gob.pe

Visite nuestra Web:
www.diresatumbes.gob.pe

Información sobre la fiebre Chikungunya



Lo que usted debe saber para
prevenir la fiebre de Chikungunya

¿Cómo se trasmite la fiebre Chikungunya?

* El virus se transmite de una persona a otra por la picadura de zancudos hembras infectadas.

* Estos zancudos suelen picar durante todo el día, aunque su actividad puede ser máxima al principio de la mañana y al final de la tarde.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre Chikungunya?

* El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones.

* Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción.

* Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura del mosquito, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12.

¿Qué hacer si una persona presenta los síntomas de la fiebre Chikungunya?

* Debe acudir inmediatamente al establecimiento de salud y seguir las indicaciones médicas.

¿Cuál es el tratamiento para la fiebre Chikungunya?

* El tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor.

* La enfermedad carece de tratamiento específico, no hay vacuna contra el virus.

* No automedicarse.

¿Cuáles son las medidas de prevención?

* Tapar los depósitos de agua y lavarlos y frecuentemente lavados con agua y escobilla.

* Vaciar desechar o colocar boca abajo los objetos que puedan acumular agua de lluvia.

* Cambiar frecuentemente el agua de consumo de animales.

* Evitar exponerse a los zancudos.


* Apoyar en las actividades de control que realiza el personal de salud en su vivienda.

¿Qué es la fiebre Chikungunya?

La fiebre chikungunya es una enfermedad transmitida al ser humano por la picadura de zancudos infectados con el virus chikungunya.

* Los zancudos que pueden transmitir la enfermedad son el *Aedes aegypti* y el *Aedes albopictus*, especies que también pueden transmitir otros virus, entre ellos el dengue

* La enfermedad rara vez puede causar la muerte pero el dolor en las articulaciones puede durar meses incluso años para algunas personas.



Contenido:

Malaria
Dengue
EDAs
IRAs



Neumonías Mayores de 5 años
Muerte Materna y Perinatal
Infecciones Intrahospitalarias
Otros daños sujetos a Vigilancia Epidemiológica






Malaria

Desde la SE 19 del año 2012 no se han presentado casos de Malaria Falciparum y no hay transmisión de Malaria Vivax desde la SE 44, pero el incremento de factores de riesgo (inicio de cultivo de arroz, lluvias esporádicas, etc.) podrían aumentar el número de casos de malaria, continuamos con la búsqueda activa de febriles, actividades intersectoriales y la comunicación a la población para disminuir los factores de riesgo, así como insistimos en el empleo de riego a secas intermitentes para disminuir el vector.

Dengue

En la SE 41 se han notificado 54 casos probables de Dengue: Sin señales de alarma (37 casos) y con señales de alarma (13 casos), correspondientes a los distritos: Tumbes (12), La Cruz (8), Aguas Verdes (09), Corrales (07), Papayal (07), Pampas de Hospital (04), Zorritos (3). En esta semana se han confirmado 17 casos de Dengue de los cuales 12 corresponden a Dengue sin señales de alarma y 05 con señales de alarma.

DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SEDALES DE ALARMA	252	782	1034
DENGUE CON SEDALES DE ALARMA	185	162	347
DENGUE GRAVE	7	2	9
FALLECIDO	1	1	2
REGIÓN TUMBES	445	947	1392




GRUPO DE EDAD	NIÑO	ADOLESC.	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
PORCENTAJE %	16.40	13.96	23.45	39.06	7.12
REGION TUMBES					

Según los casos reportados de Dengue, han sido afectados más adultos, jóvenes y niños, así como más casos en mujeres que hombres, y del total de casos un 24.9% fue con señales de alarma, a la Semana Epidemiológica 41 del año 2014.


Incidencia por Distritos de Dengue Región Tumbes 2014 (SE 41)

DISTRITO	Conf.	Prob.	Total	% Distrito	% conf. Distrito
Papayal	41.39				
San Juan	27.33				
P de Hospital	8.69				
A Verdes	7.13				
REGIONAL	5.92				
Tumbes	5.09				
Corrales	4.81				
La Cruz	3.62				
Zarumilla	3.28				
Zorritos	2.47				
San Jacinto	2.46				
Casitas	1.86				
Canoas	0.37				
Matapalo	0.00				
Total general	444	946	1390	100.0	99.5




La tasa de incidencia Regional a la SE 41 del presente año es de 5.92 casos por 1000 hab, incidencia acumulada a nivel regional es mayor a la del año pasado que fue de 0.97 casos por 1000 hab.

Los múltiples factores que presenta en conjunto la Región Tumbes (escasos servicios de saneamiento básico, acumulo de inservibles, índices aélicos elevados, aunados a ello la pobre respuesta en salud del autocuidado que brinda la población y su renuencia al uso del temephos o el mantener en adecuado estado los depósitos de agua de su casa), nos sitúa en un ALTO RIESGO para la transmisión de dengue, además hay casos confirmados de Dengue tanto al sur (Máncora, Órganos, Talara y Piura) como al norte (Ecuador) de la Región. Se ha intensificado las acciones de control vectorial en todos los distritos de la Región y la capacitación al personal de salud e involucramiento activo de todas las autoridades de la Región.



Canal endémico de Dengue Región Tumbes 2014 (SE 41)





Vigilancia Entomológica Región Tumbes Setiembre 2014

DISTRITO	VIVIENDAS INSPECC	VIVIENDAS POSITIVAS	RECIPIENTES INSPECC	RECIPIENTES POSITIVOS	INDICE AEDICO	INDICE RECIPIENTE	INDICE BRETAU
LA CRUZ	765	103	6853	145	13.46	2.12	18.95
PAMPAS DE HOS	370	26	989	26	7.03	2.63	7.03
CANOAS DE PS	474	28	1866	34	5.91	1.82	7.17
ZORRITOS	753	38	4673	57	5.05	1.22	7.57
CASITAS	123	6	772	6	4.88	0.78	4.88
MATAPALO	82	4	350	4	4.88	1.14	4.88
ZARUMILLA	364	13	1824	13	3.57	0.71	3.57
TUMBES	1612	40	6713	42	2.48	0.63	2.61
CORRALES	627	12	3628	22	1.91	0.61	3.51
PAPAYAL	677	9	1995	9	1.33	0.45	1.33
AGUAS VERDES	2614	27	12161	44	1.03	0.36	1.68
SAN JUAN	406	3	1918	3	0.74	0.16	0.74
SAN JACINTO	576	2	1894	2	0.35	0.11	0.35
REGIONAL	9443	311	45636	407	3.29	0.89	4.31

El *Aedes aegypti* se encuentra disperso en toda la Región Tumbes, por lo que la situación de riesgo se mantiene durante todo el presente año.

El análisis del canal endémico de IRAs en <5 años, muestra que estamos en la zona de Epidemia en la SE 41 del presente año, los distritos que han aumentado el reporte de casos son: Tumbes, Papayal, Zorritos, San Jacinto, Pampas de Hospital, Corrales, San Juan y Canoas de Punta Sal.



INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs), NEUMONIAS Y SOB

En la SE 41 del presente año se han notificado a nivel regional 321 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, 8 casos de SOB y ninguna neumonía graves.

Durante el presente año se viene notificando 15,970 casos de IRAs, lo que representa comparativamente con el mismo periodo del año anterior (15,341 casos) un aumento de 4.10 % en la incidencia de casos de IRAs notificados.

La tasa de incidencia regional en la SE 41 por IRAs en menores de 05 años es de 786.04 por cada 1000 menores de cinco años. Los distritos de Papayal, Pampas de Hospital y Zorritos han reportado las mayores tasas; mientras que Zarumilla, Canoas de Punta Sal y Aguas Verdes reportan las menores tasas.

NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS


En la SE 41 no se ha notificado casos de neumonía en mayores de 5 años; hasta la SE 41 se han notificado 121 casos de neumonías en > 05 años, alcanzando una tasa de incidencia de 5.646 casos por 10000 hab.

INFLUENZA

Hasta la SE 41 no se han notificado casos de influenza.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)

Incidencia distritos de IRAs en menores de 5 años Región Tumbes 2014 (SE 41)




Hasta la SE 41 no se reportan fallecidos, se han hospitalizado 63 casos y la tasa de letalidad es de 0.00 en <5 años. La variación irregular de la temperatura aumentaría el riesgo de la presencia de Neumonías y Neumonías Graves por lo que es preciso mantener la vigilancia y la adecuada atención de los pacientes y evitar sus complicaciones.

En lo que corresponde a la SE 41 del presente año se han notificado a nivel regional 60 casos de EDAs, el 96.67 corresponden a EDAs acuosas, se notificó 02 casos de EDA disintérica en < 5 años.

La tasa de incidencia regional correspondiente a la SE 41 es de 18.19 casos de EDAs por cada mil habitantes. Los distritos de Pampas de Hospital, Zorritos y Papayal, presentan las más altas tasas. Los distritos de Zarumilla, Aguas Verdes y San Jacinto han notificado las menores tasas de incidencia de EDAs.

Tasas de incidencia distrital de EDAs Población General Región Tumbes 2014 (SE 41)






PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección Regional de Salud Tumbes



Tasas de incidencia distrital de EDAs en menores de 5 años Región Tumbes 2014 (SE 41)




En los menores de 05 años se ha notificado a nivel regional 2180 casos de EDAS hasta la SE 41. Las EDAS en menores de 5 años constituyen el 51.07 % del total de EDAS notificadas. La tasa de incidencia regional en menores de cinco años es de 107.30 casos por cada 1000 menores de cinco años.

En el presente año comparativamente con la SE 41 del año anterior, se reporta un descenso del 2.47 % en la incidencia de casos de EDAs (4377 vs 4269 casos en los años 2013 y 2014 respectivamente). Requirieron hospitalización 52 casos de EDAS (07 Disentérica). No se reportan fallecidos por EDAS.

El análisis del canal endémico EDAS, muestra que en la SE 41 del presente año, estamos en zona de alerta, reportan un aumento de casos el distrito Tumbes, Corrales, Papayal, San Jacinto y San Juan de la Virgen.

Comportamiento de las EDAs en Población General SE 41 – 2014



MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL

Hasta la SE 41 en la Región Tumbes, se ha notificado 01 caso de muerte materna.

En el mes de setiembre se han reportado 06 muertes perinatales, (hasta la SE 40 hay un acumulado de 62 muertes perinatales).

ZOONOSIS

Hasta la SE 41 del presente año no se han presentado casos de rabia.

Teniasis y Epilepsias por Cisticercosis

A la SE 41 del presente año se ha reportado 05 casos de Teniasis y se han registrado 207 casos de Epilepsia asociada a Cisticercosis.

Leptospirosis y Rickettsiosis

Hasta la SE 41 del presente año se han confirmado 65 casos de Leptospirosis pertenecientes a los distritos de Tumbes (36), Aguas Verdes (05), Pampas de Hospital (4), San Juan (6), Papayal (07), Corrales (02), La Cruz (02), Zarumilla (2) y Matapalo (01) no se han confirmado casos de Rickettsiosis en la Región Tumbes.

Accidentes por Animales Ponzñosos

A la SE 41 del presente año se ha notificado 01 caso de Loxocelismo (mordedura de araña) en la localidad de Lechugal, distrito de Papayal y Provincia de Zarumilla. Se han reportado 05 casos de Ofidismo (mordedura de Serpiente) en la localidad de Lechugal, Provincia de Zarumilla, Distrito de Papayal (02 casos) y 01 caso en la localidad de Los Cedros, distrito de corrales, 01 caso en carretas, distrito de San Jacinto y 01 de Tumbes.

TUBERCULOSIS (TBC)

En la SE 41 del presente año no se ha notificado casos de TBC procedente de la Región Tumbes. Hay 36 casos confirmados hasta la presente semana; Tumbes (23), Zarumilla (04), San Jacinto (02), Zorritos (2), Corrales (02), Aguas Verdes (1) y Pampas de Hospital (2).

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH)

En el mes de Agosto del año 2014 el Hospital JAMO - Tumbes se notificaron 03 casos de Infección Intrahospitalaria (infección de herida operatoria). Se vigilaron 331 pacientes.

En el servicio de neonatología de un total de 159 días-exposición a catéter venoso periférico que correspondió a la vigilancia de 20 neonatos, 03 días- exposición a ventilador mecánico, vigilando a 01 neonato, no se reportaron casos de IIH. En UCI se vigilaron 08 pacientes con CVC y 16 con Catéter urinario y 05 con Ventilador Mecánico., no se reportó IHH

En el servicio de obstetricia de un total de 79 partos vaginales vigilados no se registró casos de endometritis. De un total de 149 partos vía cesárea no se reportó casos de endometritis, se registraron 03 casos de infección de herida operatoria.

En el servicio de medicina de 45 días exposición a catéter urinario permanente vigilado (05 pacientes), no se reportaron casos de infección del tracto urinario asociadas a este dispositivo.

En el servicio de cirugía no se presentaron casos de infecciones intrahospitalarias Post vigilancia {73 días de exposición} de: infecciones del tracto urinario asociados a catéter 0 casos {10 pacientes vigilados}, infección de herida operatoria post colecistomía 0 casos {27 pacientes vigilados}, infecciones post hernioplastia inguinal 0 casos {11 pacientes vigilados}.

COBERTURA DE NOTIFICACIÓN

En la SE 41 se ha logrado una notificación oportuna del 100% de Unidades Notificantes de la Red Regional de Vigilancia.

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

A la SE 41 del presente año se han notificado 02 casos de Sarampión/Rubeola los cuales han sido descartados por el Instituto Nacional de Salud – Perú.