




Gobierno Regional Tumbes
Dirección Regional de Salud Tumbes
Dirección Ejecutiva de Epidemiología



Boletín Epidemiológico Regional

Semana Epidemiológica **03-2019**

Del 13 al 19 de enero del 2019



Contenido

- Malaria, Dengue
- Chikungunya, Zika
- Leptospirosis
- EDAS, IRAS
- Neumonías mayores de 5 años
- Muerte Materna y Perinatal
- Infecciones Intrahospitalarias
- Otros Daños Sujetos a Vigilancia Epidemiológica



DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES

Boletín Epidemiológico Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TUMBES

Presentación

La Dirección Ejecutiva de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 03-2019.

La información del presente Boletín Epidemiológico procede de la notificación de 47 establecimientos de salud de la Red Regional de Epidemiología.

La Red Regional está conformada por establecimientos de la Dirección Regional de Salud Tumbes, EsSalud y otros del sector salud de la región Tumbes.

La información es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación.

Esta información es suministrada semanalmente por la Red Regional de Epidemiología de Tumbes, cuya fuente es el registro semanal de enfermedades y eventos sujetos a notificación inmediata o semanal. La Semana Epidemiológica inicia el domingo de cada semana y concluye el día sábado siguiente.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Dr. Oscar Michael ZAPATA YAMUNIQUE
Director Regional

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA

Dr. Rommell Veintimilla **GONZÁLEZ SEMINARIO**
Director Ejecutivo

Dr. Cesar Augusto **NOBLECILLA RIVAS**
Médico Epidemiólogo

Dra. María Edith **SOLÍS CASTRO**
Médica Cirujana

Dr. Fernando Antonio **QUINTANA YNFANTE**
Médico Epidemiólogo

Lic. Nélide **JULCA MENDOZA**
Equipo Técnico

Bach. Ronald Edward **HERNÁNDEZ VARGAS**
Responsable Regional de Notificación

Bach. Milagros Del Carmen **LOJAS RODRÍGUEZ**
Equipo Técnico

Comité Editor

Dr. Fernando A. **QUINTANA YNFANTE**
Redacción y Edición

Bach. Ronald Edward **HERNÁNDEZ VARGAS**
Diseño y Proceso de Información



email: epitumbes@dge.gob.pe
www.diresatumbes.gob.pe

Av. Fernando Belaunde Terry Mz. X Lt. 1-10
Urb. José Lishner Tudela
Telefax: 072 523789



Editorial

Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Metaxénicas

Las enfermedades metaxénicas, en el Perú, en las últimas décadas constituyen los principales problemas de salud, que afectan a las poblaciones más pobres de menos acceso y están catalogadas entre las reemergentes, afectando grandes proporciones de población, con gran impacto sobre la salud Pública nacional.

La Malaria, las arbovirosis, Bartonelosis, Leishmaniosis y Tripanosomiosis son problemas de salud, cuyo incremento en la transmisión e incremento de los factores de riesgo, ha hecho prioritario su abordaje. Problemas de salud Pública que permanente amenazan la salud de la población, son condicionados por múltiples factores, algunos de los cuales la intervención del hombre es casi nula, el desencadenamiento de estas está relacionado con los desequilibrios entre las variables climatológicas, pluviosidad, movimiento migracional, temperatura, siembra y cultivos.

Dentro de los principales objetivos es el asegurar la vigilancia epidemiológica, apropiado control de vectores y la oportuna provisión de tratamientos para reducir la incidencia y la mortalidad asociada en las áreas afectadas.

En los últimos 10 años, se ha reportado entre 200,000 a 150,000 casos de las enfermedades metaxénicas, siendo la malaria, dengue y bartonelosis, las que exponen a mayor proporción y población y afectación de la población; en los últimos 05 años, la bartonelosis se ha constituido en los principales problemas a abordar desde los servicios y la población por la elevada mortalidad y letalidad que ha venido mostrando alta mortalidad y letalidad. De la misma forma se estima que alrededor de 20, 000,000 de los peruanos residimos en áreas de riesgo de estas enfermedades, en diferentes estratos, nicho eco epidemiológicos y riesgos.

La tasa de afectación sobre la población, están relacionadas con la capacidad de respuesta de los servicios de salud, la cobertura de estos sobre los ámbitos adjudicados, oportunidad de la identificación, sensibilización de la población para el control de algunas variables intervinientes, la especie vectorial predominante, determinada específicamente por los cambios climatológicos, cepas circulantes, disponibilidad de recursos oportunos y suficientes, respuesta los esquemas de tratamiento. Con relación a la afectación por grupos etarios, este es similar para todos los grupos, observándose últimamente un giro hacia el menor de 14 años y en edad productiva, sin embargo, constituye un grupo de mayor riesgo los niños, madres gestantes y ancianos. Una explicación de este fenómeno se debe a que la población infantil, por la crisis económica que afecta a nuestro país, se está integrando a temprana edad en la PEA lo cual los hace más vulnerables a estos daños, expresando indirectamente que las poblaciones de menores recursos serían mayormente las afectadas.

Es en ese sentido es necesario promover un trabajo articulado con todos los actores sociales involucrados con el problema y su solución.

Referencia: http://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=613:vigilancia-transito-2&catid=2:vigilancia-epidemiologica&Itemid=397

Malaria - Región Tumbes SE 03- 2019

Durante los años 1998 y 1999 se reportaron hasta 32,000 y 19,000 casos de malaria respectivamente, así como muertes originadas por esta causa.

En el año 2012 (noviembre) se logra controlar la transmisión de malaria en toda la Región Tumbes (reporte de cero [00] casos continuos durante casi 06 años).

En el año 2018 (entre las S.E. 18 y S.E. 52 se captan y confirman casos malaria reportándose 36 casos de malaria por *Plasmodium vivax*, de los cuales: 19 casos son importados en personas procedentes de Venezuela y 17 casos autóctonos (Distrito Tumbes).

En el año 2019 se ha reportado 01 casos de Malaria en la región Tumbes.

Se están realizando las intervenciones para reducir la transmisión y dispersión de la enfermedad, manteniendo bajo vigilancia epidemiológica las localidades que visitaron los pacientes, así como brindándose tratamiento antimalárico a los casos y colaterales).

Las condiciones y determinantes (en especial: 1. El riego por inundación en campos de cultivos de arroz, que debe ser cambiado por riego a secas intermitentes, 2. Viviendas inseguras para el tránsito de vectores en gran parte de la Región, en las que debe implementarse celosías en puertas y ventanas), 3. Resistencia del vector a insecticidas de uso en salud pública en la Región aún se mantienen favorables para su expansión, por lo que se debe estar vigilante ante la presencia de casos importados (en especial en personas migrantes) y la aparición de nuevos casos autóctonos.

Mapa de Riesgo de Malaria- Región Tumbes SE 03-2019




Casos de Malaria - Región Tumbes 2018 (SE 52)

	Frecuencia	%
IMPORTADO	19	52.78%
TUMBES	17	47.22%
Total genera	36	100.00%

Casos de Malaria - Región Tumbes 2019 (SE 03)

Procedencia de Casos	Frecuencia	%
IMPORTADO	0	0.00%
TUMBES	1	100.00%
Total	1	100.00%



Malaria -Distribución según Etapa de Vida Región Tumbes 2019 (SE 03) Todos los casos

	Frecuencia	%
Niño	1	100.00%
Total general	1	100.00%

Malaria -Distribución de Casos Importados Región Tumbes SE 52-2018

Dengue - Región Tumbes SE 03 - 2019

Hasta la SE 03-2019 se reporta 63 casos de Dengue de los cuales 63 son probables (100%) y 00 confirmados (0.0%).



En la SE 03-2019 se han notificado 08 casos de Dengue: Probables (08 casos), confirmados (00 casos) y descartados (00).

Los distritos con mayor riesgo para la transmisión de dengue en la semana 01 son: San Juan (alto riesgo) Zorritos (alto riesgo).

La población y autoridades distritales deben priorizar sus actividades de prevención y control.

Comportamiento de Dengue años 2014 – 2019 Región Tumbes

Comportamiento de Dengue SE03- 2019 Canal Endémico Región Tumbes



La curva de los cuatro últimos años muestra periodos epidémicos de entre 1000 y 7000 casos en promedio por año, con mayor actividad epidémica en la primera mitad del año. La tendencia regional en el 2018 es oscilante en las últimas semanas epidemiológicas. En la SE 03-2019 la Región se encuentra en la zona de ALARMA

Según la clasificación clínica son: 60 casos (95.2%) de dengue sin signos de alarma, 02 casos de dengue con signos de alarma (3.2%) y 01 caso de dengue grave (1.59%). El 88.89% (56/63) de los casos de dengue fueron notificados por los distritos Tumbes, Zorritos y San Juan.

Casos de Dengue - Región Tumbes 2019 (SE03)

DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	0	60	60
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	0	2	2
DENGUE GRAVE	0	1	1
FALLECIDO	0	0	0
REGIÓN TUMBES	0	63	63

Dengue -Distribución según Etapa de Vida Región Tumbes 2018 (SE03)

PORCENTAJE %	GRUPO DE EDAD				
	NIÑO	ADOLESC.	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
REGION TUMBES	20.63	12.70	20.63	36.51	9.52


Según etapa de vida de los pacientes reportados como casos de Dengue (probables), los más afectados resultan ser los adultos, jóvenes y niños y según sexo, los hombres representan un 54% de los casos

Casos, tasas de incidencia y formas clínicas de dengue. Perú 2018* (Semana Epidemiológica 50)


Departamentos	Casos acumulados a la SE actual	Casos SE 50 2018	TIA x 100000 Hab.	Forma clínica						Fallecidos		
				Dengue sin signos alarma		Dengue con signos alarma		Dengue grave		Confirmado	Probable	
				N°	%	N°	%	N°	%			
LORETO	2081	0	191.58	1468	70.54	595	28.59	18	0.88	5	0	5
MADRE DE DIOS	1197	0	785.84	833	69.59	343	28.85	21	1.75	8	0	8
TUMBES	829	0	332.37	808	97.23	22	2.65	1	0.12	0	0	0
PIURA	778	0	41.08	718	92.53	57	7.35	1	0.13	0	1	1
UCAVALI	378	0	89.53	297	78.99	71	18.88	8	2.13	2	0	2
AYACUCHO	352	0	50.85	339	96.31	13	3.69	0	0.00	0	0	0
AMAZONAS	183	0	42.40	179	97.81	3	1.64	1	0.55	0	0	0



INCIDENCIA ACUMULADA POR DISTRITOS DE DENGUE REGIÓN TUMBES 2019 HASTA S.E. 03



Mapa de Riesgo de Dengue según 03 últimas semanas epidemiológicas (01 – 03/2019) Región Tumbes



La tasa de Incidencia Regional a la SE03 del presente año (2019) es de 0.25 casos por 1000 hab., mayor que el año 2018, la que fue de 0.02 casos por 1000 hab. Cuatro de los 13 distritos que reportan casos de dengue tienen tasa de incidencia acumulada superior a la del promedio regional: San Juan (1.40 x 1000 hab.), Zorritos (1.24 x1000 hab.) Casitas (0.45 x 1000 hab) y Tumbes(0.29 x1000 hab),

Casos de Dengue Notificados por Otras DIREAS y Región Tumbes 2019 (SE03)

Casos de Dengue	Confirmados	Probables	TOTAL
Otras DIREAS	0	12	12
Tumbes	0	63	63

Hasta la SE03 se han notificado 63 casos de dengue y adicionalmente otras DIREAS han notificado 12 casos de dengue.

Los múltiples factores que presenta en conjunto la Región Tumbes (períodos lluviosos, escasos servicios de saneamiento básico, acúmulo de inservibles, índices aélicos elevados), aunado a la pobre respuesta en salud del autocuidado de la población (mantener en adecuado estado los depósitos de agua de su casa, uso de la “motita” de piriproxifen, uso de celosías, entre otros), débil involucramiento de los actores sociales para la solución de la problemática sanitaria y casos confirmados de Dengue tanto al sur (Piura) como al norte (Ecuador) de la Región, nos sitúa en RIESGO permanente para la transmisión de Dengue. Se continúan intensificando las acciones de control vectorial en todos los distritos de la Región, pero solo el trabajo sostenido y multisectorial logrará reducir y mantener los casos controlados.

Tasa de incidencia distrital de Dengue a la S.E.03 -2019- Región Tumbes

Diagnóstico	Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
		Nº	TIA	Nº	TIA		
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	CORRALES	0	0.00	1	0.04	1	0.04
	TUMBES	0	0.00	1	0.24	1	0.24
DENGUE GRAVE	TUMBES	0	0.00	1	0.01	1	0.01
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	CASITAS	0	0.00	1	0.46	1	0.46
	LA CRUZ	0	0.00	2	0.21	2	0.21
	PAPAYAL	0	0.00	1	0.19	1	0.19
	SAN JUAN	0	0.00	6	1.43	6	1.43
		0	0.00	32	0.28	32	0.28
	ZARUMILLA	0	0.00	2	0.09	2	0.09
	ZORRITOS	0	0.00	16	1.27	16	1.27
REGION TUMBES		0	0.00	63	0.26	63	0.26

El *Aedes aegypti* se encuentra disperso en los 13 distritos (100%) de la Región Tumbes, por lo que la situación de riesgo se mantiene a lo largo del año, tanto para Dengue, como para las otras arbovirosis (Chikungunya y Zika) transmitida por el mismo zancudo.



Mapa de Dispersión de *Aedes aegypti*
Región Tumbes 2018

Chikungunya - Región Tumbes SE03 - 2019

Hasta la SE52-2018 se han reportado 16 casos de Chikungunya.

El 31.25% fue considerado probable. Se confirmaron 11 casos (68.75%).

En el año 2019 no se ha reportado ningún caso de Chikungunya en la región Tumbes.

Casos de Fiebre por virus Chikungunya por Grupos de Edad
Región Tumbes 2018 (SE52)

	Frecuencia	%
Adolescente	3	18.75%
Adulto	6	37.50%
Adulto Mayor	3	18.75%
Joven	1	6.25%
Niño	3	18.75%
Total	16	100

En lo que va del año 2018 a nivel nacional se registra disminución en el número de casos notificados. El 80.91% de estos en los departamentos de Piura.

Fuente: CDC Sala Situacional SE 50-2018.

Casos de Fiebre por virus Chikungunya - Región Tumbes 2018 (SE52)


	Frecuencia	%
Confirmado	11	68.75%
Probable	5	31.25%
Total	16	100.00%

Casos, tasas de incidencia de Chikungunya. Perú 2018* (SE 50)

Departamentos	2017			2018*		
	casos	%	TIA 100 000 Hab.	casos	%	TIA 100 000 Hab.
PIURA	763	55.69	40.37	284	80.91	15.03
TUMBES	558	40.73	223.72	19	5.41	7.62
LORETO	28	2.04	2.58	5	1.42	0.46
SAN MARTIN	11	0.80	1.24	18	5.13	2.03
ANCASH	9	0.66	0.78	0	0.00	0.00
LIMA	1	0.07	0.01	1	0.28	0.01
CUSCO	0	0.00	0.00	21	5.98	1.58
UCAYALI	0	0.00	0.00	2	0.57	0.37
LA LIBERTAD	0	0.00	0.00	1	0.28	0.05
Perú	1370	100.00	6.45	351	100.00	1.65

Fuente: CDC -Minsa Perú. www.dge.gob.pe. Sala Situacional SE 50-2018


Mapa de Riesgo de Fiebre por virus Chikungunya
Región Tumbes 2018 (SE52)



Mapa de Riesgo de Chikungunya según 03 últimas semanas epidemiológicas 2018 (49-51) - Región Tumbes



Fiebre por virus Chikungunya
Región Tumbes 2015-2018




Se interviene la Región con la aplicación de Piriproxifen en "motitas" (control larvario), las que se cuelgan en los depósitos de agua mediante un nylon, los cuales debe de conservarse por 03 meses, se realiza búsqueda en campo (casa por casa) de personas que puedan tener Dengue, Chikungunya o Zika, para la intervención oportuna con control larvario o fumigación (última barrera de acción).

Casos de Fiebre por virus Chikungunya - Región Tumbes 2018 -SE52

Diagnóstico	Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
		Nº	TIA	Nº	TIA		
FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	A VERDES	0	0.00	3	0.12	3	0.12
	CORRALES	1	0.04	0	0.00	1	0.04
	LA CRUZ	1	0.11	0	0.00	1	0.11
	PAPAYAL	2	0.37	0	0.00	2	0.37
	TUMBES	7	0.06	2	0.02	9	0.08

Zika - Región Tumbes SE03 - 2019


Mapa de Riesgo de Fiebre por virus Zika
Región Tumbes SE03-2019



Mapa de Riesgo de Zika según
03 últimas semanas
epidemiológicas 2019 (03) -
Región Tumbes



Casos por virus Zika
Región Tumbes 2017- 2019 (SE03)



Casos de Zika por Grupos de Edad
Región Tumbes 2019 (SE03)

	Frecuencia	%
Joven	2	100.00%
Total	2	100.00%

Hasta la SE03 del 2019 se han reportado 02 casos sospechosos de Zika, procedentes del distrito de Tumbes, los 02 casos notificados corresponden a gestantes del distrito de Tumbes. En el 2018 se han notificado 31 casos en gestantes (Corrales (2), Tumbes (23) Aguas Verdes (03) La Cruz (02), Pampas de Hospital (01) y Papayal (01), de las cuales 01 ha tenido su parto y el RN no tiene complicaciones hasta la fecha. La demora en la obtención de resultados dificulta y reduce el impacto de las intervenciones.

Durante el año 2017 se reportaron 18 gestantes afectadas por el virus Zika, de las cuales todas tuvieron sus partos. Se ha detectado 02 casos de microcefalia asociado a Zika hasta la fecha. Se recomienda a las mujeres evitar salir embarazadas, hasta que la epidemia de Zika se controle, y a las mujeres embarazadas proteger sus casas con celosías en puertas y ventanas para evitar que se contagien por el virus Zika, esta última recomendación es válida para toda la población

Se reportó en el 2017 el primer caso de Síndrome de Guillain Barré asociado a un caso Zika confirmado. En lo que va del año 2018 no se han reportado casos de Síndrome de Guillain Barré asociado a Zika. A nivel nacional el 35.6% de los casos se reporta en el departamento de Amazonas

Número de casos y tasa de incidencia por zika según
departamentos Perú 2016-2018*

Departamentos	2016			2017			2018*		
	casos	%	TIA 100 000 Hab.	casos	%	TIA 100 000 Hab.	casos	%	TIA 100 000 Hab.
AMAZONAS	0	0.00	0.00	99	1.62	23.30	290	28.46	67.19
PIURA	0	0.00	0.00	38	0.62	2.03	267	26.20	14.13
LORETO	1494	94.86	142.37	1205	19.76	113.79	186	18.25	17.12
UCAYALI	1	0.06	0.20	84	1.38	16.57	130	12.76	24.04
SAN MARTIN	2	0.13	0.23	24	0.39	2.78	50	4.91	5.65
TUMBES	11	0.70	4.57	96	1.57	39.45	38	3.73	15.24
ICA	1	0.06	0.13	4317	70.78	537.87	20	1.96	2.41
LA LIBERTAD	0	0.00	0.00	108	1.77	5.67	14	1.37	0.73
HUANUCO	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10	0.98	1.16
CAJAMARCA	65	4.13	4.24	15	0.25	0.98	7	0.69	0.46

Casos y tasa de Incidencia de Zika Región Tumbes 2019 (SE03)

Diagnóstico	Distrito	Confirmados		Sospechoso		Total	TIA
		Nº	TIA	Nº	TIA		
ZIKA	AGUAS VERDES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	CANOAS DE PS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	CORRALES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	LA CRUZ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	TUMBES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ZARUMILLA	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ZORRITOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	TUMBES	0	0.00	2	0.02	2	0.02
ZIKA GESTANTES	ZARUMILLA	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	PAPAYAL	0	0.00	0	0.00	0	0.00
REGION TUMBES		0	0.00	2	0.01	2	0.01

Los primeros casos de zika fueron captados en los EESS como dengue y fueron procesados para zika por diagnóstico diferencial de dengue. Es necesario continuar fortaleciendo la vigilancia de gestantes con zika, así como también la toma de muestras oportunas a los recién nacidos de madres confirmadas a zika en la gestación y de casos con síndrome congénito.

Casos de Zika Región Tumbes 2019 (SE03)


	Frecuencia	%
Sospechoso	2	100.00%
Total	2	100.00%

Leptospirosis y Rickettsiosis - Región Tumbes SE03- 2019


En el año 2019 se ha reportado 01 caso probable de Leptospirosis.

Hasta la SE02-2019 se reportan 01 casos de Leptospirosis de los cuales 01 es probable (100%) y no se ha confirmado ningún caso. En lo que va del año 2019 no se han notificado casos de Rickettsiosis. La tasa de incidencia regional de leptospirosis es de 0.004 casos por 1000 hab. Las condiciones en la Región como la humedad, las deficiencias higiénicas que ocasionan infección por roedores y poblaciones no controladas de perros, afloramiento de desagües y otras favorecen la aparición y persistencia de los casos.

Casos de Leptospirosis Región Tumbes 2013- 2019 (SE03)



INCIDENCIA POR DISTRITOS DE LEPTOSPIROSIS REGIÓN TUMBES 2019 (SE 03)



Casos de Leptospirosis Región Tumbes 2019 (SE03)

	Frecuencia	%
Probables	1	100.00%
Total general	1	100.00%


Casos de Leptospirosis por Grupos de Edad Región Tumbes 2019 (SE03)

	Frecuencia	%
Joven	1	100.00%
Total general	1	100.00%

Casos, tasas de incidencia Leptospirosis. Perú 2018* (Semana Epidemiológica 50 Fuente: CDC Sala Situacional SE 50-2018)

Departamentos	Casos	Incidencia x 100 mil Hab.	%	Fallecidos
LORETO	946	8.71	34.83	5
AYACUCHO	381	55.04	14.03	0
PIURA	260	13.76	9.57	1
TUMBES	242	97.02	8.91	0
UCAYALI	198	36.61	7.29	2
CUSCO	164	12.30	6.04	0
LAMBAYEQUE	105	8.05	3.87	0
MADRE DE DIOS	91	59.74	3.35	0
ICA	70	8.45	2.58	0
CAJAMARCA	55	3.59	2.03	0
SAN MARTIN	49	5.53	1.80	1
HUANUCO	47	5.47	1.73	0
LIMA	40	0.39	1.47	0
AMAZONAS	19	4.40	0.70	0
JUNIN	14	1.04	0.52	0
LA LIBERTAD	14	0.73	0.52	0
ANCASH	7	0.61	0.26	0
CALLAO	4	0.38	0.15	0
MOQUEGUA	4	2.15	0.15	0
PASCO	2	0.66	0.07	0
AREQUIPA	1	0.07	0.04	0
TACNA	1	0.29	0.04	0
APURIMAC	1	0.22	0.04	0
HUANCAVELICA	1	0.21	0.04	0
PUNO	0	0.00	0.00	0
Perú	2716	8.48	100.00	9

Mapa de Riesgo de Leptospirosis según 03 últimas semanas epidemiológicas 2019 (01-03) Región Tumbes



Tasa de incidencia distrital de Leptospirosis - Región Tumbes 2018 (SE52)

Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
	Nº	TIA	Nº	TIA		
AGUAS VERDES	0	0.00	26	1.08	26	1.08
CANOA DE PUNTA SAL	4	0.71	10	1.78	14	2.50
CASITAS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
CORRALES	0	0.00	32	1.31	32	1.31
LA CRUZ	1	0.11	5	0.53	6	0.64
MATAPALO	0	0.00	1	0.41	1	0.41
PAMPAS DE HOSPITAL	2	0.28	5	0.69	7	0.97
PAPAYAL	7	1.30	23	4.28	30	5.58
SAN JACINTO	0	0.00	6	0.69	6	0.69
SAN JUAN DE LA VIRGEN	0	0.00	4	0.96	4	0.96
TUMBES	8	0.07	83	0.73	91	0.80
ZARUMILLA	1	0.04	14	0.61	15	0.66
ZORRITOS	8	0.63	8	0.63	16	1.27
REGION TUMBES	31	0.13	217	0.89	248	1.02


Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), Neumonías y SOB - Región Tumbes SE02 - 2019

En la SE03 del presente año se han notificado a nivel regional 373 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, 19 casos de SOB, 04 casos de neumonía y 00 casos de neumonía grave.

Durante el presente año se viene notificando 1031 casos de IRAs, lo que representa comparativamente con el mismo periodo del año anterior (1027) una disminución de 0.39 % de casos notificados.


La tasa de incidencia regional en la SE03 por IRAs en menores de 05 años es de 51.90 casos por cada 1000 menores de 05 años. Los distritos de Papayal, Zorritos y San Jacinto han reportado las mayores tasas de incidencia de IRAs en < 5 años. Las condiciones ambientales favorecen la presencia de IRAs por lo que la población debe tomar las medidas de prevención y acudir a los establecimientos en caso de presentar síntomas respiratorios sobre todo en niños.

**Incidencia acumulada distrital de IRAs en menores de 5 años
Región Tumbes 2019 (SE03)**




En la SE03 no se reportan fallecidos por IRAs; hasta la SE03-2019 no se han hospitalizado ningún caso en < 5 años. La tasa de letalidad es de 0.00 en < 5 años. La variación irregular de la temperatura aumentaría el riesgo de la presencia de Neumonías y Neumonías Graves por lo que es preciso mantener la vigilancia y la adecuada atención de los pacientes y evitar sus complicaciones.

**Mapa de Riesgo de IRAs en menores de 5 años
según 03 últimas semanas epidemiológicas 2019
(01-03) - Región Tumbes**



Comportamiento de IRAs SE03 – 2019 Canal Endémico Región Tumbes



El análisis del canal endémico de IRAs, muestra que en la SE03 del presente año estamos en la zona de ALARMA.

NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

NEUMONIAS > 5 AÑOS	CASOS	POBLACIÓN > 5 AÑOS	INCIDENCIA x 10000 hab.
NEU_5_9A	6	20656	2.90
NEU_10_19	7	40984	1.71
NEU_20_59	6	142322	0.42
NEU_60A	16	19535	8.19
TOTAL NEUMONIAS > 5 AÑOS	35	223497	1.57

En la SE03 no se han notificado casos de neumonía grave en mayores de 5 años; hasta la SE03 se han notificado 35 casos de neumonías en > 05 años, alcanzando una tasa de incidencia de 1.57 casos por 10,000 hab.

INFLUENZA

En el año 2019 no se ha reportado ningún caso de Influenza. Hasta la SE52 se han confirmado 64 Casos de influenza A H1N1 pdm09.

Se están presentando casos de síndrome gripal a la espera de confirmación por INS.

Existe circulación de virus Influenza de cepas diferentes.


La tasa de incidencia regional correspondiente a la SE52 es de 0.26 casos de Influenza por cada mil habitantes.

El distrito de Zarumilla presenta la más alta tasa, por lo que se deben fortalecer las actividades de prevención como adecuado lavado de manos, medidas de higiene al toser o estornudar y realizar la vacunación en grupos de riesgo.


Tasa de incidencia distrital de Influenza AH1N1 - Región Tumbes 2018 (SE52)

Distrito	Confirmados	
	Nº	TIA
AGUAS VERDES	3	0.12
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0.00
CASITAS	0	0.00
CORRALES	1	0.04
LA CRUZ	1	0.11
MATAPALO	1	0.41
PAMPAS DE HOSPITAL	0	0.00
PAPAYAL	2	0.37
SAN JACINTO	1	0.11
TUMBES	22	0.19
ZARUMILLA	33	1.45
ZORRITOS	0	0.00
REGIONAL	64	0.26

Mapa de Riesgo de Influenza – SE52-2018
Región Tumbes




Mapa de Riesgo de Influenza según 03 últimas semanas epidemiológicas 2018 (49-51) - Región Tumbes



Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) - Región Tumbes SE03 - 2019

Tasas de incidencia acumulada distrital de EDAs Población General – Región Tumbes 2019 (SE03)



En lo que corresponde a la SE03 del presente año se han notificado a nivel regional 395 casos de EDAs en Población General (con un INCREMENTO del 54.11 % en relación con la misma semana del año anterior, 447 vs 974 casos en relación con los años 2018 y 2019 respectivamente).

El 100% corresponden a EDAs acuosas, no se han notificado casos de EDA disintérica en < de 5 años.

La tasa de incidencia regional correspondiente a la SE03 es de 3.91 casos de EDAs en Población General por cada mil habitantes.

Los distritos de Tumbes y Pampas de Hospital presentan las más altas tasas, por lo que se deben fortalecer las actividades de prevención como adecuado lavado de manos, uso de agua potable, eliminación adecuada de excretas, mejora en el saneamiento básico, entre otras. Ante casos de EDAs sobre todo en niños los padres o familiares deberán hidratarlos y acudir al establecimiento de salud más cercano.


En los menores de 05 años se ha notificado a nivel regional 296 casos de EDAs a la SE03. Las EDAs en menores de 05 años constituyen el 30.39% del total de EDAs notificadas.

La tasa de incidencia regional en menores de cinco años es de 15.22 casos por cada 1000 menores de cinco años. En el presente año comparativamente con la SE03 del año anterior, se reporta un incremento del 28.70% en la incidencia de casos de EDAs en < 5 años (230 y 296 casos en los años 2018 y 2019 respectivamente).


Se han hospitalizado hasta la SE05: 08 casos de EDAs en < 5 años. No se reportan fallecidos por EDAs.

El análisis del canal endémico EDAs en Población General, muestra que, en la SE03 del presente año, estamos en zona de EPIDEMIA, con localidades que han reportado un incremento en el número de casos, por lo que tanto las autoridades sanitarias como los gobiernos locales deben en conjunto tomar las acciones correctivas para controlar y disminuir la incidencia de casos.


Mapa de Riesgo de EDAs en Población General según 03 últimas semanas epidemiológicas 2019 (01-03) - Región Tumbes



Tasas de incidencia acumulada distrital de EDAs en menores de 5 años Región Tumbes 2019 (SE03)



Comportamiento de las EDAs en Población General SE03 – 2019 Canal Endémico Región Tumbes



Otros Daños de Notificación - Región Tumbes SE 03 - 2019**MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL**

En el año 2019 hasta la semana 03 no se han notificado ninguna muerte materna en la región Tumbes

Hasta la SE03 no se han notificado **muertes fetales** y ni **muertes neonatales**.

ZOONOSIS

En la SE03 2019 del presente año no se ha reportado ningún caso de rabia canina en Tumbes.

INMUNOPREVENIBLES

Hasta la SE03 del 2019 no se ha reportado ningún caso de varicela con complicaciones.

En el 2018 se presentaron 03 casos de sarampión y 01 caso de rubeola en adultos pendientes de resultados de laboratorio.

La migración venezolana de paso por la región Tumbes ha puesto en alerta a los establecimientos de salud.

Se ha confirmado 01 caso de sarampión en tránsito por Tumbes en un niño de 04 años de edad procedente de Caracas-Venezuela.

Se están fortaleciendo las acciones de vigilancia y la vacunación.

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH)

Durante el mes de diciembre no se presentaron casos de Infección Asociada a la Atención en Salud (IAAS), en el servicio de UCI, Neonatología, Medicina, Gineco-Obstetricia y Cirugía.

Hasta el mes de diciembre se presentó (32) casos de Infección Asociada a la Atención en Salud (IAAS), en el servicio de UCI, Cirugía y Gineco-Obstetricia; correspondiendo a Neumonía asociado a ventilador mecánico (14) y a infección por herida operatoria (18). No se reportaron casos en el servicio de Medicina y Neonatología.

TENIASIS Y EPILEPSIAS POR CISTICERCOSIS

En la SE03 2019 del presente año no se han reportado casos sospechosos de Teniasis. Se registran 04 casos de Epilepsia asociada a Cisticercosis.

TUBERCULOSIS

Hasta la SE03 del presente año se ha notificado 01 casos de TBC en 01 adultos.

En el 2018 Se reportan, además: 12 casos de recaída y 04 abandonos recuperados en adulto. Del total de casos 08 son portadores de VIH. Se reporta 06 personas (03 jóvenes. 01 adulto mayor y 02 adultos) fallecidas por TBC.

ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS

En la SE03 no se ha notificado ningún caso de Loxocelismo (mordedura de araña) No se reportaron casos de Ofidismo

SIFILIS CONGÉNITA

Hasta la SE03 del 2019 no se han reportado casos.

SIFILIS EN GESTANTES

Hasta la SE03 del 2019 no se han confirmado casos de sífilis en gestantes.

**Cobertura de Notificación - Región Tumbes SE03 - 2019**

DISA	CRITERIOS DE MONITOREO						PUNTAJE TOTAL
	OPORTUNIDAD	COBERTURA	CALIDAD DEL DATO	SEGUIMIENTO	REGULARIZACION	RETROINFORMACION	
DIRESA TUMBES	76.7	76.7	83.7	83.7	83.7	31.6	73.5

Puntaje Total	
A. 90 - 100	optimo
B. 80 - 90	bueno
C. 70 - 80	regular
D. Menos de 70	debil

En la SE03 se ha logrado una notificación del 73.5% de Unidades Notificantes de la Red Regional de Vigilancia.

Los indicadores de monitoreo contribuyen a mejorar la disposición de información oportuna y de calidad en el Sistema Regional de Vigilancia Epidemiológica, permiten el procesamiento y análisis para la toma de decisiones en la prevención y control de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica en salud pública.

**INDICADORES PARA EL MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
TUMBES SE 03 - 2019**

DISA	CRITERIOS DE MONITOREO						PUNTAJE TOTAL
	OPORTUNIDAD	COBERTURA	CALIDAD DEL DATO	SEGUIMIENTO	REGULARIZACION	RETROINFORMACION	
Zarumilla *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Aguas Verdes *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Cuchareta Baja	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Pocitos	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Loma Saavedra	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Matapalo	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Papayal	100	100.0	100	100	100	30	89.5
La Palma *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Uña de Gato *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
El Porvenir	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Lechugal	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Pampa Grande *	0	0.0	30	30	30	30	19.5
Puerto Pizarro	0	0.0	30	30	30	30	19.5
Andres Araujo *	0	0.0	30	30	30	30	19.5
Pampas de Hosp	0	0.0	30	30	30	30	19.5
Cabuyal	0	0.0	30	30	30	30	19.5
El Limon	0	0.0	30	30	30	30	19.5
Cruz Blanca	0	0.0	30	30	30	30	19.5
San Juan de la V	0	0.0	30	30	30	30	19.5
Cerro Blanco	0	0.0	30	30	30	30	19.5
Grabanzal	0	0.0	30	30	30	30	19.5
Corrales *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
San Isidro	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Malval	100	100.0	100	100	100	30	89.5
La Cruz *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
San Jacinto	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Rica Playa	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Vaqueria	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Casa Blanqueada	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Oidor	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Zorritos *	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Grau	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Cancas	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Acapulco	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Bocapan	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Barrancos	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Pajaritos	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Cañaveral	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Trigal	100	100.0	100	100	100	30	89.5
La Choza	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Capitan Hoyle	100	100.0	100	100	100	30	89.5
Hospital SAGAR	100	100.0	100	100	100	30	89.5
HOSPITAL REG	100	100.0	100	100	100	100	100.0
DIRESA	76.7	76.7	83.7	83.7	83.7	31.6	73.5